

風しん対策事業（予防接種）説明書

先天性風しん症候群を予防するための予防接種は、任意予防接種（ご自身の判断で接種するかどうか決めるものです）です。

風しん抗体検査の結果、抗体価が十分ではない（H I 抗体価16倍以下、E I A 価8.0未満（デンカ生研）又は国際単位①30IU/ml未満（シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス(株)、極東製薬工業(株)）、国際単位②45IU/ml未満（シスメックス・バイオメリュー(株)、ベックマン・コールター(株)）とされた方に対して、先天性風しん症候群の発生防止を目的として風しんの予防接種の助成（自己負担有り）を行います。

風しんは、免疫のない女性が妊娠中（特に妊娠初期）に感染すると、胎児が先天性風しん症候群（難聴、心疾患、白内障などの障害）となるおそれがあります。

市では下記の対象者に麻しん風しん混合（MR混合）又は風しん単体の予防接種を実施いたします。以下の注意事項を接種前に必ず読んでください。

1 対象者

立川市に住民登録がある19歳以上の方で、妊娠を予定又は希望する女性及びその同居者、または妊婦の同居者のうち、次の①～③のいずれかに該当する方。

- ① 風しん抗体検査事業における抗体検査の結果、抗体価が十分ではないとされた場合
- ② 妊婦健診で抗体価が十分ではないことが判明し、出産後に速やかに予防接種を受ける場合
- ③ 自身で医療機関での抗体検査を受け（自由診療）、抗体価が十分ではないとされたため予防接種を希望する場合（抗体価が十分ではないことが書類等で確認できる場合）。

※妊娠中の方は接種できません。予防接種後2か月間は妊娠を避けることが必要です。

- 2 実施期間 平成30年 11月1日から平成31年3月31日まで
- 3 実施方法 市内指定医療機関で予約をし、接種してください。
- 4 実施場所 市内指定医療機関（4ページ）
- 5 必要書類
 - 1) 予診票（医療機関に置いてあります）
 - 2) 住所等確認書類（下記3種のうちいずれか）
※運転免許証、健康保険証、発行から3か月以内の住民票
 - 3) 対象者②、③の方については抗体価が十分でないことを確認出来る書類等
- 6 自己負担額

麻しん風しん（MR）混合ワクチン	5,000円
風しん単抗原ワクチン	3,500円

※接種対象期間外や市内指定医療機関以外で接種を受けた場合は、全額自己負担になります。また、接種後の費用の払い戻しはありません。

7 接種前の注意

- ① この説明書を必ず読んでから接種してください。
- ② 健康状態によく注意し、少しでも体調が悪ければ接種しないでください。

8 接種不相当者と接種要注意者

* 予防接種を受けることができない者

- ① 明らかな発熱を呈している者（37.5℃以上をいいます）
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- ③ 接種しようとするワクチンの接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことが明らかな者（アナフィラキシーとは接種後30分以内に起こる重い即時型のアレルギー）
- ④ 妊娠している者
- ⑤ その他、医師が不相当な状態と判断した者
医療機関において、接種不可と診断された場合は助成されません。
(全額自己負担です。)

* 予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなくてはならない者

- ① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患および発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者
- ② 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
- ③ 過去にけいれんの既往のある者
- ④ 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者
- ⑤ 接種しようとする接種液の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者

9 予防接種の接種間隔

(1) 違う種類のワクチンを接種する場合の間隔

不活化ワクチン（日本脳炎、インフルエンザ等）を接種後は、6日以上の間隔をあけて次のワクチンを接種する。

生ワクチン（麻しん、風しん等）を接種後は、27日以上の間隔をあけて次のワクチンを接種する。

※同じ種類のワクチンを複数回接種する必要がある場合は、それぞれ定められた間隔をあける。

(2) 疾病罹患後の間隔

麻しんについては、治癒後4週間程度の間隔をあける。

水痘及びおたふくかぜについては、治癒後2～4週間程度の間隔をあける。

その他のウイルス性疾患（突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑等）については、治癒後1～2週間の間隔をあける。

10 接種後の注意

- ① 接種後30分間は、ショックや重いアレルギー症状がおこることがありますので医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。
- ② 接種部位は清潔に保ちましょう。接種後1時間以上経過すれば、入浴をしても差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
- ③ 接種後に高熱やけいれんなどの異常が現れた場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
- ④ 接種後4週間は体調に注意しましょう。また接種後腫れが目立つときなどは医師にご相談ください。
- ⑤ 接種当日は激しい運動はさけてください。

11 予防接種の有効性

予防接種は、その病気にかからないことを目的にしていますが、受ける人の体質、その時の体調などによって抵抗力（免疫）ができないこともあります。

抵抗力（免疫）ができたかどうかを知りたい場合には、血液をとって血中の抗体を測定すれば（有料）わかる場合もあります。

12 麻疹（はしか）の症状

麻疹ウイルスの空気感染によって起こります。感染力が強く、予防接種を受けないと、多くの人がかかる病気です。発熱、せき、鼻汁、めやに、発疹を主症状とします。最初3～4日間は38℃前後の熱で、一時おさまりかけたかと思うとまた39～40℃の高熱と発疹がでます。高熱は3～4日で解熱し、次第に発疹も消失します。しばらく色素沈着が残ります。

主な合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があります。患者100人中、中耳炎は7～9人、肺炎は1～6人に合併します。脳炎は1,000人に2人の割合で発生がみられます。また、亜急性硬化性全脳炎（SSPE）という慢性に経過する脳炎は約5万例に1例発生します。また、麻疹（はしか）にかかった人は数千人に1人の割合で死亡します。

13 風しんの症状

風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。潜伏期間は2～3週間です。軽いかぜ症状ではじまり、発疹、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。そのほか、眼球結膜の充血もみられます。発疹も熱も約3日間で治るので「三日ばしか」とも呼ばれることがあります。合併症として、関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などが報告されています。血小板減少性紫斑病は患者3,000人に1人、脳炎は患者6,000人に1人くらいです。大人になってからかかると重症になります。

妊婦が妊娠早期にかかると、先天性風しん症候群と呼ばれる病気により心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った児が生まれる可能性が高くなります。

14 麻疹風しん混合ワクチンについて

麻疹ウイルス及び風しんウイルスを弱毒化してつくったワクチンです。

既に麻疹、風しんの両方ともかかってしまった場合には接種の必要はありません。

なお、ガンマグロブリンの注射を受けたことがある方についての接種時期については、かかりつけ医と相談してください。

15 副反応

副反応の主なものは、発熱と発疹です。これらの症状は接種後4～14日に多くでます。なお、接種直後から数日中に過敏症状と考えられる発熱、発疹、そう痒などがでることがありますが、1～3日で治ります。

これまでの麻疹ワクチン、風しんワクチンの副反応のデータから、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、脳炎、けいれんなどの副反応が、まれに生じる可能性もあります。

16 予防接種法の定期接種によらない任意の接種によって健康被害（医薬品を適正にしようしたにもかかわらず発生した副作用により入院が必要な程度の疾患や障害など）が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による被害救済の対象となります。

お問い合わせは 立川市福祉保健部健康推進課予防健診係

TEL 042-527-3272

抗体検査はすべての医療機関で実施します

予防接種の取り扱いワクチンについては下記をご確認ください

医療機関名	所在地	電話	麻しん 風しん 混合	風しん 単体	医療機関名	所在地	電話	麻しん 風しん 混合	風しん 単体
井上レディースクリニック	富士見町 1-26-9	529-0111	○	○	まるはし女性応援クリニック	曙町 2-9-5	512-8736	○	○
唯善クリニック内科・呼吸器内科	富士見町 1-34-9	527-6711	○	○	リボンレディースクリニック	曙町 2-10-1	548-3715	○	○
つづきクリニック	富士見町 4-10-18	540-4180	○	○	立川クリニック	曙町 2-11-2	526-5900	○	○
多摩整形外科	富士見町 7-13-8	525-0727	○	○	クリニックファール	曙町 2-34-6	521-6221	○	○
毛利もとこ女性クリニック	柴崎町 2-1-8	540-3300	○	○	立川通クリニック	高松町 2-1-27	524-7929	○	○
もりかわよしゆき小児科	柴崎町 2-1-8	540-6525	○	○	宮本整形外科医院	高松町 2-39-12	525-6168	○	○
田中内科医院	柴崎町 2-14-25	521-7252	○	○	タウンクリニック	高松町 3-21-9	524-2321	○	○
ナビタスクリニック立川	柴崎町 3-1-1	521-5334	○	○	たちかわファミリークリニック	高松町 3-28-7	527-2783	○	○
厚生連クリニック	柴崎町 3-6-10	529-5677	○	○	林整形外科	栄町 2-59-16	534-1131	○	○
立川内科クリニック	柴崎町 3-8-2	548-0730	○	○	藤井医院	栄町 5-22-6	536-1702	○	○
馬場クリニック	柴崎町 3-10-20	548-3981	○	○	ふじさわクリニック	栄町 5-37-12	537-1600	○	○
グリーンウッドスキンクリニック立川	柴崎町 3-11-20	523-2300	○	○	浅見内科医院	若葉町 1-11-20	537-0918	○	○
みやもとクリニック	錦町 1-6-18	524-3855	○	○	若葉こどもクリニック	若葉町 1-11-22	538-3910	○	○
川野病院	錦町 1-7-5	522-8161	○	○	立川若葉団地クリニック	若葉町 4-25-1	536-3197	○	○
立川相互ふれあいクリニック	錦町 1-23-4	524-1371	○	○	さいわいこどもクリニック	幸町 1-11-3	536-7280	○	○
立川相互病院付属子ども診療所	錦町 1-23-25	525-6555	○	○	あおば内科クリニック	幸町 3-1-3	537-7500	○	○
立川駅南泌尿器科皮膚科クリニック	錦町 2-1-33	548-8802	○	○	神津小児科医院	幸町 3-30-11	537-0600	○	○
たもり内科クリニック	錦町 2-1-33	548-0808	○	○	永井産婦人科病院	幸町 4-27-1	535-3544	○	○
玉置クリニック	錦町 2-3-13	522-5317	○	○	松土胃腸科外科医院	幸町 5-44-10	535-6668	○	○
こむかい産婦人科	錦町 2-3-30	525-3524	○	○	内田内科医院	幸町 5-95-4	535-3974	○	○
福井クリニック	錦町 3-1-16	540-2910	○	○	菅家医院	柏町 4-2-15	536-4602	○	○
共済立川病院	錦町 4-2-22	523-3131	○	○	玉川上水クリニック	柏町 4-57-29	536-0333	○	○
和光診療所	錦町 6-28-15	527-0037	○	○	みのやまクリニック立川	泉町 935-1	512-5272	○	○
はごろも内科・小児科	羽衣町 1-16-9	522-5234	○	○	西砂川病院	砂川町 8-2-3	535-8811	○	○
松生クリニック	羽衣町 2-12-27	522-7713	○	○	重城内科クリニック	上砂町 1-2-3	538-7431	○	○
野上医院	羽衣町 2-42-7	522-6010	○	○	豊泉胃腸科外科	上砂町 3-19-2	534-7611	○	○
さいとう内科外科クリニック	羽衣町 3-12-3	529-5993	○	○	古岡整形外科	上砂町 3-55-10	535-5558	○	○
石井医院	曙町 1-19-4	522-2030	○	○	砂川医院	上砂町 4-22-1	536-2734	○	○
江守皮膚科クリニック	曙町 2-5-18	527-6525	○	○	やましたクリニック	一番町 2-36-5	569-7555	○	○
佐藤秀昭内科医院	曙町 2-7-19	548-0317	○	○	岡部医院	一番町 2-46-10	531-3391	○	○
むさしのアレルギー呼吸器クリニック	曙町 2-8-30	548-3688	○	○	めぐろクリニック	西砂町 6-6-16	520-1234	○	○

* 医療機関に予約してから受けてください。

* ワクチン等の在庫の有無、実施時間等については、医療機関にお問い合わせください。

* 検温は医療機関で行います。